

پیام های بهداشتی پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و حیوان برای عموم مردم

- بیماری کشنده و دلخراش هاری از طریق گزش و بزاق حیوانات هار مثل: سگ، گربه، روباه و دیگر حیوانات هار به انسان انتقال می یابد. لذا بایستی در برخورد با حیوانات وحشی مهاجم و دارای علائم بیماری، مراقب گازگرفتگی بود و در صورت وقوع گازگرفتگی برای واکسیناسیون و دیگر اقدامات درمانی بلافاصله به واحد مراقبت و پیشگیری هاری در مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمود. حیوانات اهلی خانگی یا سگهای گله باید بصورت منظم توسط درمانگاههای دامپزشکی معاینه و علیه بیماری واکسینه شوند.
- نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه بدون مراقبت دامپزشکی علاوه بر بیماری هاری، می تواند سبب انتقال بیماریهای انگلی مثل کیست هیداتید، توکسوپلاسموز و ... شود. بنابراین این حیوانات باید بطور منظم زیر نظر دامپزشک معاینه و داروهای ضدانگلی دریافت نمایند.
- محل نگهداری حیوانات خانگی بایستی مرتباً تمیز و ضدعفونی و از تماس بچه ها و خانم های باردار با آنها پرهیز و از تماس حیوانات خانگی با حیوانات وحشی و ولگرد جلوگیری شود.
- برای قطع چرخه زندگی انگل ها و پیشگیری از انتقال بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، ضمن جلوگیری از کشتار قاچاق دام، ضایعات کشتارگاهی بویژه قسمت های آلوده به کیست های انگلی باید از دسترس حیواناتی مثل سگ و گربه و حیات وحش دور باشد.
- میوه جات و سبزی های آلوده به مدفوع سگ و گربه و حیوانات وحشی دیگر می تواند موجب انتقال آلودگی های انگلی و میکروبی مثل کیست هیداتید، توکسوپلاسموز و عفونت ها و مسمومیت هایی به انسان شود. لذا قبل از مصرف باید با استفاده از چند قطره مایع ظرفشویی در یک ظرف آب کاملاً شستشو و با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی و سپس مصرف گردند. همچنین باید مراقب بود آلودگی های متقاطع مثل آلودگی ناشی از کارد یا میز آلوده در آشپزخانه اتفاق نیفتد.

- گوشت قرمز باید از فروشگاه‌ها و قصابی‌های مجاز که واجد شرایط بهداشتی و دارای مهر دامپزشکی روی لاشه می باشند تهیه گردد. مصرف گوشت‌های غیرمطمئن بویژه بصورت کبابی و نیم پز می تواند موجب انتقال آلودگی‌های باکتریایی و انگلی به انسان گردد.
- گوشت طیور فاقد بسته بندی مورد تأیید دامپزشکی یا در صورت نگهداری در شرایط نامناسب و انقضای تاریخ مصرف می تواند موجب بیماری و مسمومیت های غذایی مصرف کننده شود.
- مصرف شیر و دیگر فراورده های لبنی غیرپاستوریزه مثل پنیرهای محلی و بستنی های سنتی تهیه شده از شیر غیرپاستوریزه می تواند موجب ابتلا به بیماری خطرناک تب مالت (بروسلوز) و دیگر عفونت های گوارشی خطرناک شود. لذا از مصرف شیر خام، پنیر محلی، بستنی سنتی و دیگر محصولاتی که از شیر خام و غیرپاستوریزه تهیه می‌شوند باید جداً اجتناب گردد.
- تماس مستقیم دامداران با جنین‌های سقط شده و ترشحات زایمان دامهای مذکور می‌تواند موجب انتقال بیماری‌هایی مثل تب مالت گردد، لذا هنگام تماس با دامها باید نکات بهداشتی رعایت شود.
- بعضی از بندپایان مثل کنه، می‌توانند موجب انتقال بیماریهای خطرناکی مثل تب‌های خونریزی دهنده (تب کریمه کنگو) به انسان شوند. بنابراین باید محل نگهداری دامهای اهلی مثل گاو، گوسفند و بز در اماکن روستایی از محل زندگی انسان جدا و مرتباً با سمپاشی مناسب از بندپایان ناقل مثل کنه، پاکسازی شود. همچنین دامداران باید از تماس دست با کنه یا له کردن آنها با دست خودداری نمایند.
- افرادی که به اقتضای شغلی با حیات وحش در تماس‌اند مثل: دامپزشکان و تکنسین‌های دامپزشکی و محیط بانان، کارکنان باغ وحش ها و... باید ضمن رعایت مراقبت های لازم واکسن های ضروری مثل واکسن هاری را دریافت نمایند.

برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان به خصوص بیماری‌های تب مالت، تب

خونریزی دهنده کریمه کنگو، هاری و

- از خرید دام زنده و یا گوشتهایی که بصورت غیر بهداشتی ذبح و عرضه می شوند خودداری کنید.
- دام زنده را از مراکز عرضه مجاز تحت نظر دامپزشکی خریداری کنید.
- از ذبح دام در منازل و معابر عمومی خودداری کنید.
- به هیچ وجه دامی را که دارای علایم بیماری و ناخوشی است را ذبح و مصرف ننمایید.
- گوشت تازه ۲۴ ساعت و جگر و سایر اعضاء و احشاء دامی ۴۸ ساعت قبل از مصرف ، در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- از مصرف گوشت و جگر خام و نیم پز خودداری نموده و غذاهای کاملاً پخته شده مصرف نمایید.
- از دستکاری، کندن و یا له کردن کنه های موجود بر روی دامها خودداری نمایید.
- از تماس با خون حیوان ذبح شده بر روی اندامهای بدن خودداری نمایید.
- از مصرف فرآورده های لبنی غیرپاستوریزه (شیر، پنیر، بستنی، خامه و ...) خودداری نمایید.
- از تماس ، نزدیک شدن و غذا دادن به حیواناتی از قبیل سگ و گربه خودداری نمایید.
- در صورت گاز گرفتگی یا خراش توسط حیواناتی از قبیل سگ و گربه و سایر پستانداران ، ضمن شستشوی محل گزیدگی با آب و صابون بمدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه ، سریعاً جهت دریافت واکسن ضد هاری به مراکز مراقبت و پیشگیری هاری مراجعه نمایید.
- در صورت مشاهده مار و عقرب و حشرات زهرآگین ، از نزدیک شدن و یا دستکاری آنها خودداری نمایید.
- در صورت گزش توسط مار و عقرب ، جهت انجام اقدامات درمانی و تزریق سرم ضد زهر ، به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید.
- جهت جلوگیری از نیش پشه ها و پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از حشرات از قبیل سالک ، از وسایل حفاظت فردی مانند پمادهای دور کننده حشرات و لباسهای با آستین بلند استفاده نمایید.